MOLLUSCHI
Charonia lampas (Linnæus, 1758)
sinonimo **Charonia nodifera (Lamarck, 1822)**
regno animali
fam. Ranellidae

Fonte immagine foto O. Caro

Questo mollusco, chiamato volgarmente tritone, mostra la conchiglia più grande tra quelle delle diverse specie presenti nel Mar Mediterraneo, capace di raggiungere i 30 centimetri di lunghezza ed eccezionalmente anche i 40 centimetri. La conchiglia ha forma conica, con giri poco evidenti, ma con l'ultimo giro piuttosto ampio, e mostra un'apertura (stoma) ovale, che appare affusolata nella parte superiore. Anche le coste e gli anelli non hanno rilievi particolarmente evidenti, ma possono presentare alcune serie di tubercoli ingrossati.

Il colore delle conchiglie tende ad essere piuttosto chiaro e va dal marrone beige al bianco (bianco ghiaccio) e al giallino, sino al verdastro, con tonalità marrone scuro nelle parti depresse o avvallate. Il labbro esterno è chiaro (bianco ghiaccio) e mostra spesso inspessimenti tipo dentini o unghie, a intervalli piuttosto regolari e di colore marrone, che si prolungano oltre il margine, rendendolo irregolare. Il labbro interno è prevalentemente chiaro (biancastro).

Fonte immagine foto O. Caro

L'animale mostra un mantello chiazzato, con base grigio biancastra e macchie molto compatte di colore arancio o più scure (rossastre). Queste sono così diffuse da far apparire la parte molle dell'animale di un bel colore arancio più o meno uniforme. Su questa livrea spiccano le due antenne, che sono giallastre per parte della loro lunghezza e ornate da due sottili fasce nere.
Charonia lampas predilige i fondi melmosi e ricchi di pietre e sassi e quelli detritici. Si trova però anche in fondali rocciosi o nelle praterie sottomarine.
Le profondità alle quali vive sono generalmente comprese tra i 15 ed i 65 metri di profondità. Si tratta di una specie carnivora che si nutre prevalentemente di ofiure, ma non disdegna anche le stelle rosse. Talvolta si ritrova in gruppi numerosi di esemplari di piccole dimensioni.

Si tratta di una specie che è presente nel Mar Mediterraneo Occidentale e Centrale. In Italia è segnalata nelle acque del Centro e Sud Tirreno e nel Mar Adriatico Meridionale. Si ritrova anche lungo le Coste Atlantiche, nell'area compresa tra l'Irlanda e il Portogallo.
La raccolta indiscriminata a causa della bellezza della sua conchiglia, specie da parte di subacquei (soprattutto in tempi non recenti), ha reso questa specie piuttosto rara.

Questa specie è molto simile a *Charonia tritonis variegata*.
Charonia lampas si distingue per lo stoma (bocca) più ampio ed il labbro con sporgenze a forma di unghie, ben evidenti e prolungate. In questa specie il bordo della columella mostra un callo lamellare con costine trasversali e in rilievo (denti columellari) poco rilevate e di colore bianco su un fondo di colore bianco o beige chiaro. In *Charonia tritonis*, le costine sono più rilevate e ben evidenti perché su di un fondo di colore scuro.
In generale *Charonia lampas* ha conchiglia più irregolare e nodosa e meno appuntita e colorata, mostra infatti spesso colorazioni chiare. In questa specie il mollusco ha generalmente colore più scuro e antenne sulle quali le zone di colore giallo sono meno vivaci e ampie.

Attenzione la scheda potrebbe contenere lievi inesattezze o imprecisioni in quanto non è stata ancora controllata da un esperto dello specifico gruppo sistematico cui appartiene la specie descritta.